

Mesures d'adaptació al Pla de Mitigació en l'entorn residencial

Des de que es va iniciar la campanya de vacunació a les residències el passat dia 29 de desembre, la situació epidemiològica a l'interior dels centres residencials ha experimentat una millora radical. Malgrat això des de fa uns dies els nivells epidemiològics a al comunitat s'han disparat, especialment en població no immunitzada, i han obligat a publicar un Pla de mitigació que va entra en vigor el passat dia 2 de juliol, <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/modificacio-annex-procediment-coronavirus-mitigacio.pdf> .

Per tot plegat, us fem arribar aquesta nota que repassen les les mesures que caldrà reforçar en aquesta nova fase de mitigació pel que fa a l'àmbit de les Residències de Gent Gran, de persones amb discapacitat i de Salut Mental, així com en Centres de Dia i centres ocupacionals.

Cal insistir de nou que els principals objectius d'aquestes mesures, són:

- Reduir les possibilitats que el virus penetri a l'interior de les residències.
- Mantenir i consolidar les mesures que permeten la socialització dels residents amb el seu entorn de forma segura

Per tal de treballar en aquestes dues línies de forma paral·lela les mesures a reforçar són:

- **Diagnòstic de casos simptomàtics.** En usuaris i treballadors amb símptomes compatibles amb COVID-19 de menys de 5 dies d'evolució, la prova d'elecció és TAR, Si TAR negatiu i persisteix la sospita clínica, es realitzarà PCR.
- **Cribatge periòdic de professionals.** Segons EPG a professionals no vacunats amb pauta complerta. Durant les properes setmanes i fins a millora situació epidemiològica es realitzaran **cribratges setmanals**. Segons capacitat laboratori es pot intercalar TAR amb PCR per automostra nasal.
- **Vacunació de nous professionals que s'incorporen.** La immunització es realitzarà a través del circuit habitual amb els EAP, i amb la **vacuna Janssen**, que permet una resposta immunitària més ràpida. Tanmateix, cal seguir reforçant al màxim la protecció amb EPI dels treballadors.

- **Visites de familiars.** Caldrà realitzar TAR a totes les persones que **NO puguin justificar la seva vacunació complerta a través de la Meva Salut o altres mitjans**. També caldrà recordar l'ús mascareta quirúrgica als visitants en espais interiors. Reforçar interrogatori a TOTS els visitants, sobre contacte amb algun cas positiu les últimes 48 hs i sobre presència de símptomes de refredat comú (mucositat, mal de coll, mal de cap, etc). Si presència de contacte o símptomes sospitosos, cal suspendre la visita. Qualsevol resultat positiu en TAR, cal suspendre la visita
 - En **visites/sortides fora de residència** recomanació us de mascareta quirúrgica en interiors, en residents i familiars. En usuaris no vacunats o incorrectament vacunats es recomana fer TARs seriat 0-5-10-15 dies després del retorn a la residència. Cal potenciar la vacunació d'aquest usuaris.
- **Reactivar residències sentinella.** En aquestes residències sentinella, incloure cribratge a TOTS professionals de forma periòdica, cada 15 dies amb PCR per automostra. Sistema de vigilància epidemiològica. En cas d'aparèixer un positiu cribrar a la resta de residents.
- Disposar d' **habitacions per aïllaments/ quarentenes** en residències. En cas de no poder disposar-ne, garantir les places a residències buffer
- En aquesta situació epidemiològica, evitar realitzar cursos dins de les instal·lacions de les residències, a excepció dels propis.

Barcelona, 5 de juliol de 2021